

**UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA
FACULTAD DE ENFERMERIA**



**INCLUSIÓN FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES
CON TUBERCULOSIS DEL CENTRO DE SALUD DE SURQUILLO,
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, LIMA, 2018**

TESIS

PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA

**PRESENTADO POR
BACH. ROMERO CÉSPEDES, LUCERO TATIANA**

**ASESORA:
MG. ANA MARÍA AMANCIO CASTRO**

LIMA, PERÚ

2018

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la inclusión familiar y la calidad de vida de los pacientes con tuberculosis del Centro de Salud de Surquillo, durante el primer trimestre, 2018. El método que se utilizó fue descriptivo, con un diseño correlacional y de tipo cuantitativo. La muestra de estudio estuvo conformada por 55 pacientes. Para la recolección de datos se utilizó como instrumento el cuestionario, que a través de la prueba de Alfa de Cronbach se obtuvo una confiabilidad fuerte de 0,880 y 0,889. Los resultados arrojaron que el 58% de los pacientes encuestados presentan un nivel regular con respecto a la variable inclusión familiar, el 27% presentan un nivel bueno; 15% un nivel malo, también se evidencia que el 53% de los pacientes encuestados presentan un nivel regular con respecto a la variable calidad de vida, el 33% presentan un nivel bueno; 15% un nivel malo. Según la comprobación de la hipótesis, se obtuvo que la variable inclusión familiar está relacionada directa y positivamente con la variable calidad de vida, según la correlación de Spearman de 0.657. Se recomendó a las Licenciadas en enfermería, realizar sesiones educativas brindando información de manera clara y sencilla para que la población entienda la importancia de la inclusión familiar y su relación con la calidad de vida. Así como también el apoyo incondicional para una mejor transición de la enfermedad.

PALABRAS CLAVE: Inclusión, calidad de vida, tuberculosis.

ABSTRACT

The present study aimed to determine the relationship between the family inclusion and quality of life of patients with TB in the Surquillo Health Center, during the first quarter, 2018. The method used was descriptive, correlational design and quantitative type. The study sample was conformed by 55 patients. The questionnaire, which was a strong 0,880 and 0,889 reliability using Cronbach's alpha test was used as an instrument to data collection. Results showed that the 58% of surveyed patients presented a regular level with respect to the variable family inclusion, the 27% presented a good level 15% a bad level, there is also evidence that the 53% of surveyed patients they have a regular level with respect to the variable quality of life, the 33% presented a good level and a 15% a bad level. According to the verification of the hypothesis, obtained variable family inclusion is directly and positively related with the variable quality of life, according to the correlation of Spearman of 0.657. Is recommended to the licensed in nursing, educational talks about the importance of inclusion and family and its relationship with the quality of life of the patients with tuberculosis, must provide information in a clear and simple way to that the population understands the importance of the family inclusion, of support for a better transition of the disease.

KEY WORDS: Inclusion, quality of life, tuberculosis.